

INFORMATOR DLA PACJENTA

Eliminacja drobnoustroju chorobotwórczego przed zabiegiem operacyjnym

W związku ze stwierdzeniem u Pana/ Pani drobnoustroju odpowiedzialnego za możliwość wystąpienia zakażenia rany pooperacyjnej, co w ostateczności może skutkować odrzuceniem implantu, bardzo prosimy o zastosowanie się do poniższych zasad celem eliminacji bakterii.

By wyeliminować wykrytą w wyniku badania bakterię należy:

1. Wykupić w aptece (lub w sklepie zaopatrzenia medycznego) jeden z proponowanych poniżej zestawów, na które składa się żel do nosa oraz preparat antybakteryjny do mycia ciała i włosów. Wszystkie preparaty dostępne są bez recepty.

a) Zestaw pierwszy:

- Octenisan emulsja myjąca do ciała i włosów
- Octenisan żel do nosa

b) Zestaw drugi:

- Prontoderm roztwór (500ml) lub pianka do mycia ciała i włosów
- Prontoderm nasal gel – żel do nosa

2. Następnie należy wykonywać przez 5 kolejnych dni wszystkie poniższe działania tak, aby zakończyć je jeden dzień przed planowaną datą operacji:

a) Wykupiony żel do nosa należy stosować codziennie wprowadzając do przedniej części nosa wystarczającą ilość produktu za pomocą patyczka kosmetycznego. Żel należy wprowadzić do każdego nozdrza, zamknąć nos poprzez ściśnięcie palcami skrzydeł nosa, a następnie masować przez około 2 minuty.

Uwaga!

I. Octenisan żel do nosa należy stosować dwa razy na dobę.

II. Prontoderm nasal gel do nosa należy stosować trzy razy na dobę.

b) Równocześnie, codziennie przez 5 kolejnych dni należy wykonać kąpiel całego ciała z zastosowaniem zakupionego wcześniej preparatu antybakteryjnego z zachowaniem poniższych zaleceń:

- Octenisan emulsja myjąca - nierozcieńczoną emulsję nanieść na wilgotną jednorazową myjkę, natrzeć ciało i włosy, odczekać 1 minutę i spłukać.
- Prontoderm roztwór lub pianka do mycia ciała i włosów – na jednorazową myjkę nalać roztwór lub nałożyć piankę i natrzeć dokładnie całe ciało oraz włosy i pozostawić do wyschnięcia lub odczekać 1 minutę i wytrzeć ciało, a po 3-5 minutach włosy.

1. Włosy należy umyć przynajmniej w 2 i 4 dniu leczenia.

2. Podczas eliminacji należy codziennie, po wzięciu prysznica, zmieniać pościel i ubrania.

3. Jeżeli nie ma możliwości codziennej zmiany pościeli, należy zmienić ją przed rozpoczęciem leczenia i ponownie po jego zakończeniu.

4. Pościel, ręczniki i ubrania powinno się prać w pralce w temperaturze 60 °C.